




[< Terug](#) / [Home](#) / [Patiënten](#) / [Onderzoek en behandeling](#) / Hyperventilatie provocatietest

Hyperventilatie provocatietest

Het doel van deze test is met behulp van een gestandaardiseerde hyperventilatie provocatietest aan te tonen of er sprake is van hyperventilatie (te veel ademen).

De test bestaat uit drie minuten diep en snel in- en uit ademen, gevolgd door een herstelfase van vijf minuten.

Voor aanvang van de test wordt een klachtenscorelijst ingevuld.

Tijdens de test wordt met behulp van ECG electrodes op de borst en rug de hartslag gemeten. Het zuurstofgehalte in het bloed wordt via een klipje aan de vinger in de gaten gehouden.

Daarnaast speelt de hoeveelheid uitgeademende koolzuur (CO₂) voor, tijdens en na de test een belangrijke rol. Dit wordt gemeten met behulp van een meetsensor in het gezichtsmasker.

Na de test wordt gekeken of de klachten tijdens de test, vergelijkbaar zijn met de klachten die thuis worden ondervonden.



Aandoeningen

Onderzoeken

Behandelingen

Er zijn verschillende aandoeningen die te maken hebben met de informatie op deze pagina. Wilt u hier meer over lezen? Klik dan hiernaast op één van de aandoening en lees verder.

[Unilaterale / bilaterale vestibulopathie](#)

[SCDS -Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrome](#)

[MdDS; Mal de Débarquement Syndroom](#)

[Orthostatische hypotensie](#)

[Vestibulaire paroxysmen](#)

BPPD; kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid

Ziekte van Ménière

Neuritis Vestibularis

Benigne recidiverende vertigo

Hyperventilatiesyndroom

Vestibulaire Migraine

PPPD; Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid

Bezoekadres

Gelre Apeldoorn

Albert Schweitzerlaan 31

7334 DZ Apeldoorn

[Plan uw route](#)



[Disclaimer](#) | [Privacy statement](#) | [Cookies](#)

